


ВВЕДЕННЯ ВАКЦИНИ – Інформація для медичного працівника

Щеплення дозволяється проводити тільки зареєстрованими в Україні вакцинами/анатоксинами відповідно до інструкції з їх використання, затвердженими в установленому порядку


БЦЖ

Вводиться як внутрішньошкірна ін'єкція



Вводиться в плече
(зазвичай ліве)

Дерміс
(шкіра)
Підшкірний
шар
М'язи



Доза 0.05 мл

Розмір голки 10 мм,
26 калібр

Геп В, АКДП, НіВ, ІПВ, АКДП-НіВ-Геп В,
пневмококова вакцина


Вводиться як внутрішньом'язова ін'єкція



Вводиться:

Немовлята – зовнішня
середина стегна
Діти > 2 років – верхня
частина плеча

Дерміс
(шкіра)
Підшкірний
шар
М'язи




Доза 0.5 мл

Розмір голки 25 мм,
23 калібр

КПК


Вводиться як підшкірна ін'єкція (внутрішньом'язове введення не є помилкою)



Вводиться:

Діти >1 року – плече

Дерміс
(шкіра)
Підшкірний
шар
М'язи



Доза 0.5 мл

Розмір голки 25 мм,
23 калібр

ОПВ

Вводиться перорально



Вводяться оральні краплі через піпетку

Відкрийте рот дитині, злегка притримуючи
пальцем підборіддя у немовлят, або злегка
стиснути щоки між пальцями. Тримайте
флакон із піпеткою над ротом під кутом 45°.

Доза 2 краплі

НАЛЕЖНА ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ВАКЦИНАЦІЇ:

- ❖ вітання пацієнтів та ввічливе звернення
- ❖ загальна готовність до проведення вакцинальної сесії
- ❖ забезпечення правильного положення дитини або дорослого
- ❖ дотримання правильної послідовності при введенні декількох вакцин за один візит:
 - спочатку вводяться оральні вакцини (ОПВ);
 - якщо вводяться кілька ін'єкційних вакцин, то спочатку БЦЖ, потім пневмококова, потім та, що містить компонент проти гемофільної інфекції типу b (НіВ), потім та, що містить АКДП компонент, потім та, що містить Геп В компонент, потім та, що містить коровий компонент.

